

Name:

geb.am:

Pat.Nr.:

Aufklärungsbogen:

Magenspiegelung mit Durchführung einer BRAVO-Kapsel-pH-Metrie

Bitte halten Sie vor der Untersuchung eine zwölfstündige Nüchternphase ein. Am Morgen der Untersuchung sollten keine Medikamente eingenommen werden. Im Rahmen der Magenspiegelung wird ein Endoskop vorsichtig in die Speiseröhre, den Magen und bis in den oberen Zwölffingerdarm eingeführt. Sämtliche einsehbaren Schleimhautabschnitte werden genau beurteilt. Bei Auffälligkeiten oder bestimmten Fragestellungen (z.B. Vorliegen einer Bakterienbesiedlung im Magen) können Gewebeproben entnommen werden. Hiervon merken Sie nichts.

Gegen Ende der Untersuchung wird die BRAVO-Kapsel mit einer Sonde neben dem Endoskop in die Speiseröhre eingeführt. Die optimale Position der Kapsel ist 6 cm oberhalb des Mageneinganges. Durch Sog wird ein kleines Stück Schleimhaut in die Kapsel eingesaugt und mit einem kleinen Metallstift verankert. Die Kapsel löst sich von der Sonde und verbleibt für mindestens 48 Stunden in der Speiseröhre. Fortan wird jede Änderung des Säuregehaltes (pH-Wert) registriert. Zudem haben Sie die Möglichkeit, über spezielle Tasten anzugeben, wann Sie stehen bzw. liegen, wann Sie Ihre Mahlzeiten zu sich nehmen und ob Beschwerden aufgetreten sind. Dies erklären wir Ihnen detailliert vor der Untersuchung. Sie sollten sich während der 48-stündigen Aufzeichnungsdauer genau so verhalten wie sonst im Alltag auch: die Ernährung sollte normal weitergeführt werden, Arbeit und Sport wie gewöhnlich durchgeführt werden. Nach 48 Stunden finden Sie sich erneut in der Praxis ein und die Aufzeichnung wird beendet. Die Daten werden auf den PC übertragen und ausgewertet. Das Ergebnis liegt spätestens am Folgetag vor. Hierauf kann Ihnen eine klare Behandlungsempfehlung gegeben werden.

Bei jeder endoskopischen Untersuchung mit oder ohne Entnahme von Gewebeproben besteht ebenso wie bei der Durchführung einer BRAVO-Kapsel-pH-Metrie theoretisch die Gefahr einer Verletzung der Magen-, Speiseröhren- oder Zwölffingerdarmwand. Diese Verletzung kann eine Nachblutung und – im schlimmsten Fall – eine Operation nach sich ziehen. Die Wahrscheinlichkeit einer solch schweren Verletzung ist äußerst gering. In unserer eigenen Erfahrung gab es bislang keine Probleme.

Um die Gefahr einer Nachblutung zu minimieren, sollten Sie folgendes beachten:

Sollte bei Ihnen eine Marcumar- oder Coumadin-Therapie durchgeführt werden, muss diese mindestens 7 Tage vor Untersuchung beendet werden. Der Quick-Wert sollte bei mindestens 60% liegen. Wir bitten Sie, den aktuellen Quick-Wert am Untersuchungstag mitzubringen. Eine ASS-Medikation ist unbedenklich, lediglich die Kombination von ASS mit Clopidogrel (Plavix, Iscover) sollte verhindert werden. Bitte sprechen Sie uns rechtzeitig auf Ihre Medikamente an.

Da beim Anbringen der BRAVO-Kapsel keine starken Würgebewegungen der Speiseröhre vorliegen sollten, ist die Durchführung einer leichten Sedierung mittels „Schlafspritze“ empfehlenswert. Bitte beachten Sie, dass Sie nach einer solchen Schlafspritze den ganzen Tag nicht aktiv am Straßenverkehr (Auto, Fahrrad, Motorrad etc.) teilnehmen, keine Verträge unterschreiben und keine gefährlichen Maschinen bedienen dürfen. Gerne können wir Ihnen eine Arbeitsunfähigkeits-Erklärung für den Untersuchungstag ausstellen. Bei Zuwiderhandlung gegen diese Anweisung behalten wir uns strafrechtliche Schritte vor.

Im Falle einer möglichen Schwangerschaft sollte die Kapselendoskopie nicht durchgeführt werden.

Liegen bei Ihnen Allergien gegenüber bestimmten Medikamenten vor?

Nein Ja

Wenn ja, welche? _____

Liegt bei Ihnen eine erhöhte Blutungsneigung vor (Schnell blaue Flecken am Oberkörper/Rücken nach Stoßen, verlängerte Menstruationsblutung, häufiges Nasenbluten)?

Nein Ja

Sind Sie zuckerkrank bzw. liegt ein Diabetes mellitus vor?

Nein Ja

Falls ja, welche Medikamente nehmen Sie ein (Insulin?)

Kann eine Schwangerschaft zum jetzigen Zeitpunkt sicher ausgeschlossen werden?

Nein Ja

Ich bestätige hiermit, dass ich die Informationen über die Durchführung einer Magenspiegelung mit BRAVO-Kapsel-pH-Metrie ausführlich gelesen und verstanden habe. Ich wurde ausführlich mündlich durch Frau/Herrn Dr. _____ über die Untersuchung, ihre Risiken und alternative Behandlungsmöglichkeiten aufgeklärt. Meine Fragen wurden mir vollständig beantwortet. Ich bin einverstanden mit der Durchführung einer Magenspiegelung mit einer leichten Sedierung (Schlafspritze) und der Durchführung einer BRAVO-Kapsel-pH-Metrie. Ich versichere, dass ich am heutigen Tag nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen werden.

Ort, Datum

Unterschrift Patient/gesetzl. Vertreter

Unterschrift Arzt