

Name:

geb.am:

Pat.-Nr.:

Aufklärungsbogen:

Durchführung einer Dünn- oder Dickdarmkapselendoskopie

Zur Durchführung einer Kapselendoskopie ist eine Vorbereitung Ihres Darmes notwendig. Die Vorbereitungsmaßnahmen für die Dünndarm- bzw. Dickdarm-Kapselendoskopie sind unterschiedlich. Bitte lesen Sie hierzu die Detailbeschreibungen „Dünndarmkapselendoskopie“ bzw. „Dickdarmkapselendoskopie“.

Die Kapselendoskopie ist risikoarm. In der Regel verlässt die Kapsel ca. 6 bis 10 Stunden nach Untersuchungsende den Darm. In seltenen Fällen verbleibt die Kapsel länger (bis zu einigen Tagen) im Darm, was oft nicht zu Beschwerden führt. Mittels Röntgen kann überprüft werden, ob die Kapsel im Darm weiterwandert. In sehr seltenen Fällen kann die Kapsel jedoch im Darm stecken bleiben. Das geschieht nur bei hochgradigen Engstellen wie z.B. bei Vernarbungen nach großen Voroperationen, Tumoren oder hochgradigen Dünndarmentzündungen. Wir werden Sie hierzu im Vorfeld gezielt befragen. Sollte die Kapsel den Darm nicht verlassen, muss sie mit einem Dünndarm-Endoskop geborgen werden. Falls dies wider Erwarten nicht gelingt, kann auch eine Operation notwendig werden.

Im Falle einer möglichen Schwangerschaft sollte die Kapselendoskopie nicht durchgeführt werden.

Liegen bei Ihnen Allergien gegenüber bestimmten Medikamenten vor?

Nein Ja

Wenn ja, welche?

Liegt bei Ihnen eine erhöhte Blutungsneigung vor (Schnell blaue Flecken am Oberkörper/Rücken nach Stoßen, verlängerte Menstruationsblutung, häufiges Nasenbluten)?

Nein Ja

Sind Sie zuckerkrank bzw. liegt ein Diabetes mellitus vor?

Nein Ja

Falls ja, welche Medikamente nehmen Sie ein (Insulin?)

Kann eine Schwangerschaft zum jetzigen Zeitpunkt sicher ausgeschlossen werden?

Nein Ja

Ich bestätige hiermit, dass ich die Informationen über die Durchführung einer Dickdarm-/Dünndarm-Kapselendoskopie ausführlich gelesen und verstanden habe. Ich wurde ausführlich mündlich durch Frau/Herrn Dr. _____ über die Untersuchung, ihre Risiken und alternative Behandlungsmöglichkeiten aufgeklärt. Meine Fragen wurden mir vollständig beantwortet. Ich bin einverstanden mit der Durchführung einer Dickdarm-/Dünndarm-Kapselendoskopie, ggf. mit Durchführung einer Magenspiegelung. Eine Magenspiegelung ist nur notwendig, falls die Kapsel den Magen nicht selbstständig verlässt. Diese würde mit einer leichten Sedierung (Schlafspritze) durchgeführt und hätte zur Folge, dass Sie am Untersuchungstag nicht aktiv am Strassenverkehr teilnehmen dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift Patient/gesetzlicher Vertreter

Unterschrift Arzt